

Un informe alerta de la degradación en Galicia de zonas de valor ecológico

■ *El estudio del Observatorio de la Sostenibilidad, señala la artificialización de la costa*

Un informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) correspondiente al período 1987-2000 señala "la regresión sufrida en Galicia en áreas de gran valor ecológico,

como estuarios, en beneficio de nuevas zonas urbanas y portuarias". El informe también advierte de la artificialización del litoral y de los incendios forestales.

madrid
AGENCIAS

El informe "Cambios de ocupación del suelo en España", elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) y referido al período 1987-2000, destaca en Galicia "la regresión sufrida por áreas de gran valor ecológico, como estuarios, en beneficio de nuevas zonas urbanas y portuarias". El informe también advierte de la artificialización del litoral, con pérdida incluso de humedales, por aumento de la densidad urbana y construcción de puertos y otras infraestructuras, especialmente en las Rías Baixas.

El Observatorio de la Sostenibilidad, organismo impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares, subraya en el estudio la expansión de la superficie artificial en Galicia debido al aumento de redes de infraestructuras de transporte como autopistas, zonas portuarias y aeropuertos. Asimismo, se ha incrementado, asegura, la superficie de embalses, ocupando espacios agrícolas y forestales.

El informe hace hincapié en el aumento de las explotaciones mineras a cielo abierto y cómo "la mayor parte de las nuevas zonas mineras se han desarrollado sobre suelos que estaban ocupados por matorrales".

En Galicia, según el estudio,



Las Rías Baixas, como Sanxenxo, es la zona más afectada.

El informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad de España destaca en Galicia "la regresión sufrida por áreas de gran valor ecológico, como estuarios, en beneficio de nuevas zonas urbanas y portuarias"

"revisten especial importancia las superficies quemadas que en el período 1991-2000 alcanzaron un promedio anual de más de 25.000 hectáreas". Los cambios en la

superficie forestal en el período de estudio se han debido "al proceso de artificialización y a la transformación en zonas agrícolas".

De menor cuantía han sido las

áreas forestales urbanizadas y las que se han ocupado por embalses. No obstante, en el informe también se analiza cómo las actuaciones de apoyo y fomento a las zonas forestales promovidas desde la administración se han traducido en una clara apuesta por este sector. El estudio señala que esta expansión se ha realizado, en algunos casos, a base de especies autóctonas, pero sobre todo con especies de crecimiento rápido, como el eucalipto.