



FAUNA

# Se abre la media veda para 2.000 cazadores murcianos

Durante un mes se podrán matar presas de caza menor en el que podría ser "el mejor año de la década", según el presidente de la Real Federación Española de Caza

**J.H.**  
**E**l presidente de la Real Federación Española de Caza, Andrés Gutiérrez de Lara, anunció ayer que la media veda de caza se abre en toda España a partir de hoy, prolongándose hasta el 6 de septiembre. Durante este tiempo, unos 600.000 cazadores de toda España, de los cuales más de 2.000 pertenecen a la Región de Murcia, podrán recorrer los cotos autorizados para atrapar las especies autóctonas de temporada. En nuestras sierras, eso quiere decir que se podrá cazar la codorniz, la tórtola común y la paloma torcaz.

Gutiérrez de Lara vaticinó que ésta será una veda "muy positiva", afirmando que 2009 podría ser "el mejor año de la década". Y es que, según sus declaraciones, "hacia muchos años que no se registraban tantas entradas de codornices por el sur de la Península". No durarán mucho en la Región, ya que cuando comience la siega se irán desplazando, sobre todo a Castilla y León y el este de la Península.

El presidente de la Federación también advirtió que los incendios hacen "mucho daño a todas las especies en general, no sólo a las afectadas por la media caza, porque los animales solamente se asientan en terrenos donde tienen comida". De todas formas, indicó que "el fuego afecta más a otro tipo de especies, aunque la tórtola se ve perjudicada, ya que habita en los bosques".

Ante la inminente apertura de la media veda, Gutiérrez de Lara pidió a los cazadores que respeten la normativa de cada comunidad autónoma ya que pueden "hacer un trabajo cinegético fenomenal".



Un grupo de cazadores en plena actividad

**LOCALIZACIÓN**

**Tórtola común**

Es la especie más abundante en la Región, y se puede encontrar sobre todo en la Comarca del Campo de Cartagena: Torre Pacheco, Sucina, la propia Cartagena, hasta incluso los alrededores de Mazarrón.

**Codorniz**

Aunque no tan abundante como la tórtola, la codorniz prolifera en la zona noroeste de la Comunidad Autónoma, alrededor de Moratalla, sobre todo en las localidades de Campo de San Juan y El Sabinar.

**Paloma torcaz**

Esta especie escasea en terrenos de la Región, pero la que hay se encuentra en el noroeste, en la zona alta de Caravaca, Carrascoy e incluso hasta El Garruchal.

## Continúa la temporada del conejo

**J.H.**  
■ Aunque en un principio la veda en la caza de conejos comenzaba el 2 de agosto, la Dirección General de Patrimonio y Biodiversidad de la consejería de Agricultura y Agua ha prorrogado la temporada en la Región de Murcia hasta el 6 de septiembre, coincidiendo con el cierre de la media veda. La prolongación del descaste de este mamífero fue solicitada por la Federación de Caza murciana debido a la abundancia de ejemplares de esta especie en los montes de la Región.

**La Consejería ha prorrogado la caza de este mamífero en la Región hasta el 6 de septiembre**

**Aunque se encuentra en remisión, aún hay zonas en las que este animal sufre la plaga de mixomatosis**

Pese a su actual abundancia, el conejo de la Península lleva durante más de una década sufriendo los efectos de una plaga de mixomatosis que hace algunos años casi termina con su pobla-

ción. Con la plaga conviven en este momento áreas de Alicante y Valencia, La Rioja, Tarragona, Jaén y Córdoba, pero en otras como Huelva "apenas hay nada", afirmó Andrés Gutiérrez de Lara.

El presidente de la Real Federación Española de Caza informó de que la organización está desarrollando un proyecto junto al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, los laboratorios SYVA y la Fundación Biodiversidad, por el que realizarán pruebas de campo de una vacuna para evitar la enfermedad. En la actualidad, la mixomatosis se combate fumigando las madrigueras de esta especie en los cotos de caza, con lo cual casi se ha conseguido erradicar la plaga en algunas zonas de España.